

BULLETIN

DU
MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

ANNÉE 1969. — N° 2.

490^e RÉUNION DES NATURALISTES DU MUSÉUM

30 JANVIER 1969

PRÉSIDENTE DE M. LE PROFESSEUR TH. MONOD

COMMUNICATIONS

SUR UNE COLLECTION D'OISEAUX DU SAHEL SÉNÉGALAIS

Par A. DESCARPENTRIES et A. VILLIERS

Au cours d'une mission à caractère essentiellement entomologique que nous avons effectuée au Sénégal, d'août à décembre 1967, nous nous sommes efforcés de récolter également des Vertébrés et plus particulièrement des Oiseaux.

Ces derniers ont été collectés uniquement dans la zone semi-aride du Ferlo et dans la vallée du fleuve Sénégal. En effet, l'époque de notre mission correspondait à la période de fermeture de la chasse et nous avons dû à l'amabilité de M. DIOM, Directeur des Eaux et Forêts, d'obtenir un permis de chasse scientifique, malheureusement limité aux deux seules Région du Fleuve et Région de Diourbel.

La collection réunie comprenait 240 spécimens, la plupart mis en peau grâce au dévouement de notre ami Th. LEYE, agent technique à l'IFAN. Si elle ne recèle pas de grandes raretés ornithologiques, elle apporte néanmoins des précisions de localités et de dates que M. le Professeur Jean DORST a jugées suffisamment intéressantes pour nous conseiller de publier la présente liste. Aux spécimens récoltés, nous avons ajouté les observations concernant les espèces indubitablement déterminées.

On trouvera dans une note précédente (A. DESCARPENTRIES et A. VILLIERS, Compte-rendu sommaire d'une mission au Sénégal, *Bull. Inst. fond. Afr. noire*, **31**, 2, 1969, pp. 702-706, 1 carte, phot.) la liste des localités prospectées et une carte explicative.

Dans la liste ci-dessous nous avons suivi la nomenclature de P. L. DEKEYSER et J. H. DERIVOT (*Initiations africaines*, XIX, Les Oiseaux de l'Ouest africain, 3 fasc., IFAN, Dakar, 1966-1968). A notre connaissance la faune ornithologique

du Ferlo central n'a jamais fait l'objet de publications particulières, si ce n'est une courte note d'observations (A. VILLIERS, Sur la faune ornithologique de la région de Linguère, *Notes africaines*, 1953, n° 60, pp. 123-125, 2 fig.), alors que celle de la vallée du Fleuve est relativement bien connue par les excellents travaux de MM. G. MOREL et F. ROUX.

Il est intéressant de noter qu'un certain nombre des espèces observées aux environs de Linguère en 1948 (A. VILLIERS, *loc. cit.*) n'ont été ni récoltées ni observées en 1967. Certaines d'entre elles, telles que l'Autruche et la Pintade ont certainement été victimes du braconnage qui s'est considérablement développé à la faveur du forage des puits et du percement des pistes pare-feux. D'autres ne fréquentent peut-être la région qu'en saison sèche, période des premières observations.

Fam. ARDÉIDÉS

Bubulcus ibis (Linné). — Très commun partout. — Paléarctique, africain et oriental.

Butorides striatus atricapillus (Afzelius). — Ndilla, près de Linguère, 26-IX. — Espèce subcosmopolite, la sous-espèce en Afrique noire.

Fam. ANATIDÉS

Dendrocygna viduata (Linné). — Linguère, 27-29-IX. — Régions néotropicale, éthiopienne et Madagascar.

Fam. CHARADRIIDÉS

Afribix s. senegalus (Linné). — Somdandé, 10-IX ; Mbidi, 16-XI. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal à l'Uganda.

Sarciophorus t. tectus (Boddaert). — Linguère 7-8-IX ; Ndilla, 13-20-IX ; très commun partout. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal à la mer Rouge.

Hoplopterus spinosus (Linné). — Richard-Toll, 9-XI. — Iles méditerranéennes, Asie mineure, zones découvertes d'Afrique au Sud du Sahara, jusqu'aux grands lacs.

Himantopus h. himantopus (Linné). — Linguère, 27-IX ; observé à Richard-Toll, XI. — Région méditerranéenne, Sud de l'Asie, Afrique et Madagascar.

Actitis hypoleucos (Linné). — Somdandé, 10-IX ; Ndilla, 22-IX ; Richard-Toll, 9-XI. — Nicheur dans la région paléarctique.

Erolia minuta (Leisler). — Richard-Toll, 9-XI. — Nicheur dans la région paléarctique, rencontré toute l'année dans l'Ouest africain.

Philomachus pugnax (Linné). — Richard-Toll, 9-XI. — Nicheur en Europe et Asie septentrionale, rencontré toute l'année en Afrique.

Tringa glareola Linné. — Richard-Toll, 9-XI. — Nicheur dans la région paléarctique, rencontré toute l'année en Afrique.

Fam. JACANIDÉS

Actophilornis africanus (Gmelin). — Richard-Toll, 12-XI. — Observé à Ndilla, 9-IX, et Barkedji, 13-IX. — Toute l'Afrique, au Sud du Sahara.

Fam. BURHINIDÉS

Ædicnemus s. senegalensis Swainson. — Linguère, 27-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce typique du Sénégal au Chari et au Loango.

Ædicnemus capensis maculosus Temminck. — Somdandé, 11-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce *maculosus* du Sénégal à la mer Rouge.

Fam. OTIDIDÉS

Choriotis arabs stieberi (Neumann). — Djambal, près Linguère, 28-IX et 2-X. — Nord-Ouest du Maroc et région éthiopienne, la sous-espèce *stieberi* du Sénégal à la mer Rouge.

Eupodotis s. senegalensis (Vieillot). — Tatki, 10-XI ; Mbidi, 16-XI. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce typique du Sénégal à l'Ouest de l'Ethiopie.

Lissotis m. melanogaster (Rüppell). — Djambal, 26-IX ; Observé à Linguère, 17-IX et Linné, 14-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce typique du Sénégal à l'Angola et au Zambèze.

Fam. RALLIDÉS

Gallinula chloropus Brehm. — Richard-Toll, 12-XI. — Subcosmopolite.

Fam. NUMIDIDÉS

Numida meleagris Linné. — Ranerou, 18-IX ; observé à Yonoféré, 18-IX. — Toute l'Afrique au Sud du Sahara, sauf en forêt ; Maroc, Comores, Madagascar.

Fam. PHASIANIDÉS

Francolinus bicalcaratus (Linné). — Somdandé, 10-IX ; Ndilla, 9-IX ; Linguère, 9-15-IX ; très commun partout. Pontes observées en septembre. — Du Sénégal au Tchad. Maroc.

Ptilopachus p. petrosus (Gmelin). — Barkedji, 12-27-IX ; Ndilla, 28-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce typique du Sénégal au Nord Cameroun.

Fam. PTÉROCLIDIDÉS

Pterocles e. exustus Temminck et Lang. — Mbané, au Sud de Richard-Toll, 8-XI ; Richard-Toll, 9-XI. — Espèce soudano-deccanienne, la sous-espèce typique du Sud de la Mauritanie à la Somalie et au Tanganyika.

Pterocles q. quadricinctus Temminck. — Somdandé, 11-IX ; Djambal, 28-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce typique du Sénégal au Tchad.

Fam. COLUMBIDÉS

Cena c. capensis (Linné). — Somdandé, 10-IX ; Linndé, 14-IX-1967 ; Ndilla, 22-IX. Très commun partout. — Afrique, Madagascar, la sous-espèce typique de la Mauritanie à l'Arabie.

Streptopelia roseogrisea bornuensis Bannermann. — Tessekré, 16-IX ; Mbané, près Richard-Toll, 8-XI-1967 ; Tatki, 10-XI. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce *bornuensis* de la Mauritanie au Tchad.

Streptopelia decipiens shelleyi (Salvadori). — Mbané, 8-XI ; Dagana, 11-XI ; Ndilla, 7-IX ; observé à Ranerou et Yonoféré, 18-IX ; Tatki, 18-IX. — Espèce éthiopienne, la forme *shelleyi* du Sénégal au Tchad.

Stigmatopelia s. senegalensis (Linné). — Ndilla, 7-IX ; Linguère 8-IX ; observé à Ranerou et Yonoféré, 18-IX ; Tatki, 10-XI. — De l'Afrique du Nord à l'Inde, la forme typique en Afrique, au Sud du Sahara.

Turtur abyssinicus delicatulus (Sharpe). — Observé à Ndilla ; 11-IX ; Ranerou et Yonoféré, 18-IX, Tatki, 10-XI. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce *delicatulus* du Sénégal au Nil Bleu.

Vinago waalia (Meyer). — Ndilla, 22-IX. — Du Sénégal à l'Arabie et au Kenya.

Fam. FALCONIDÉS

Necrosyrtes m. monachus (Temminck). — Observé à Linguère, IX, Tatki, 10-IX et Ndilla, 9-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce typique du Sénégal à l'Uélé.

Pseudogyps africanus (Salvadori). — Ndilla, Avec le précédent. — Afrique, au Sud du Sahara.

Torgos tracheliotus (Smith). — Ndilla, avec les précédents. — Du Sénégal au Zemmour et au Kenya.

Accipiter badius sphenurus Rüppell. — Ndilla, 26-IX. — Espèce paléarctique orientale et africaine, la sous-espèce *sphenurus* du Sénégal à l'Arabie et au Kenya.

Butastur rufipennis (Sundevall). — Tessekré, 16-IX. — Régions sahélienne et soudanienne, de la Mauritanie au Sudan.

Haliaetus vocifer Brehm. — Observé à Ndilla, 9-IX. — Toute l'Afrique au Sud du Sahara.

Circaetus cinerascens J. W. Müller. — Barkedji, 12-IX ; Ndilla, 28-IX. — De la Guinée portugaise au Nil, à l'Angola et au Zambèze.

Terathopius ecaudatus (Daudin). Observé à Ndilla, 9-IX. — Toute l'Afrique au Sud du Sahara.

Fam. PSITTACIDÉS

Poicephalus senegalus (Linné). — Tessekré, 16-IX ; Linndé, 14-IX ; très commun partout, observé dans presque toutes les stations du Ferlo central. — Du Sénégal au Chari.

Psittacula k. krameri (Scopoli). — Tessekré, 16-IX ; observé à Ndilla, 9-IX et Linndé, 14-IX. — Espèce éthiopienne et orientale, la forme typique du Sénégal au Nil blanc.

Fam. CUCULIDÉS

Centropus s. senegalensis (Linné). — Ndilla, 28-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal au Nil et au Zambèze.

Clamator cafer Lichtenstein. — Ndilla, 21-IX. — Afrique, au Sud du Sahara.

Cuculus canorus gularis Stephens. — Ndilla, 13-IX ; Somdandé, 19-IX. — Du Sénégal au Soudan et au Natal.

Lampromorpha k. klaasi (Stephens). — Ndilla, 13-IX, un exemplaire juvénile à face ventrale entièrement barrée de sombre. — Du bas Sénégal et de la Guinée portugaise au Nord-Ouest de l'Éthiopie et au Cap.

Fam. PICIDÉS

Campethera punctuligera (Wagler). — Somdandé, 11-XI ; Barkedji, 12-IX. — Du Sénégal au Bahr-el-Ghazal et à l'Uélé.

Fam. CAPITONIDÉS

Lybius vieilloti rubescens (Temminck). — Mbané, 8-XI. — Largement répandu en Afrique, la sous-espèce *rubescens* du Sud de la Mauritanie au Darfur.

Fam. CAPRIMULGIDÉS

Macrodipteryx longipennis (Shaw). — Ndiakhaye, 17-XI. — Du Sud de la Mauritanie à la Guinée portugaise et à l'Érythrée.

Scotornis climacurus Vieillot. — Ndilla, 14-IX ; Ndiakhaye, 17-XI. — Toute l'Afrique intertropicale.

Fam. COLIIDÉS

Colius m. macrourus (Linné). — Ndilla, 22-IX ; Mbané, 8-XI ; observé au Sud de Richard — Toll, XI. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sud de la Mauritanie à la Mer Rouge.

Fam. CORACIIDÉS

Coracias abyssinicus Hermann. — Linguère, 8-IX ; très commun, observé dans toutes les stations. — Du Sud de la Mauritanie à la Guinée portugaise, à l'Arabie et à l'Uganda.

Coracias n. naevius Daudin. — Ndilla, 25-IX ; Linguère, 16-IX ; observé à Linndé, 14-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal à l'Érythrée et au Tanganyika.

Eurystomus glaucurus afer (Latham). — Ndilla, 25-IX ; observé à Bar-kedji, 13-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce *afer* du Sénégal à l'Erythrée et au Kasai.

Fam. MÉROPIDÉS

Merops a. albicollis Vieillot. — Ndilla, 7-13-25-26-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sud de la Mauritanie à l'Arabie et à l'Angola.

Merops orientalis viridissimus Swainson. — Ndilla, 30-IX ; Mbané, 8-XI. — Sud de la région paléarctique, régions éthiopienne et orientale, la sous-espèce *viridissimus* du Sénégal à l'Éthiopie.

Fam. ALCÉDINIDÉS

Ceryle r. rudis (Linné). — Richard-Toll, 11-XI. — Afrique au Sud du Sahara, Asie mineure, golfe persique, etc.

Halcyon s. senegalensis (Linné). — Ndilla, 7-25-27-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal à l'Angola.

Fam. BUCÉROTIDÉS

Bucorvus abyssinicus (Boddaert). — Cette espèce protégée a été observée à maintes reprises : Yonoféré, 18-IX ; Ndilla, 9-IX ; Linndé, 14-IX ; Djambal, 28-IX et 2-X ; Tatki, 10-XI. — Du Sud de la Mauritanie à l'Éthiopie et au Kenya.

Tockus e. erythrorhynchus (Temminck). — Ndilla, 7-28-IX ; très commun partout, dans le Ferlo comme dans la vallée du Fleuve. Ponte et poussins observés en septembre. — Espèce éthiopienne, la forme typique de la Mauritanie au Tanganyika.

Tockus n. nasutus (Linné). — Tessekéré, 16-IX ; Ndilla, 28-XI ; commun dans le Ferlo central, mais moins abondant que le précédent. — Même répartition que le précédent, mais moins sahélien.

Fam. UPUPIDÉS

Phoeniculus purpureus senegalensis (Vieillot). — Linndé, 14-IX ; Ndilla 25-28-IX ; Tatki, 10-IX. Coloration du bec variant du noir au rouge. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce *senegalensis* du Sénégal au Tchad et à la Sierra Leone.

Upupa epops senegalensis Swainson. — Ndilla, 26-IX ; Tatki, 10-XI. — Tout l'Ancien Monde, la forme *senegalensis* du Sénégal au Kenya.

Fam. MUSCICAPIDÉS

Tchitrea v. viridis (P. L. S. Müller). — Ndilla, 25-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal au Nil au Congo et au Kenya.

Fam. SYLVIIDÉS

Camaroptera b. brevicaudata (Cretzmar). — Mbané, 8-XI. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal à l'Uelé et à la Mer Rouge.

Hippolais pallida (Hemprich et Ehrenberg). — Somdandé, 19-IX. — Espèce paléarctique.

Phylloscopus s. sibilatrix (Bechstein). — Ndilla, 21-IX. — Espèce paléarctique. D'après M. F. Roux, cet exemplaire serait le second connu du Sénégal.

Sylvia c. communis Latham. — Mbané, 8-XI. — Espèce paléarctique, migratrice dans l'Ouest africain d'août à mai.

Sylvietta b. brachyura Lafresnaye. — Somdandé, 10-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal à l'Érythrée.

Fam. TURDIDÉS

Cercotrichas p. podobe (P. L. S. Müller). — Somdandé, 10-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce typique non citée du Sénégal par DEKEYSER et DERIVOT (1966) qui indiquent seulement « Atar, régions sahéliennes, du Sud de la Mauritanie à la mer Rouge et à l'Ouest de l'Arabie ».

Myrmecocichla a. aethiops Cabanis. — Ndilla, 25-IX. — Espèce éthiopienne, la sous espèce typique du Sud de la Mauritanie et du Sénégal au Damer-gou.

Phœnicurus ph. phœnicurus (Linné). — Ndilla, 28-30-IX. — Nicheur dans la région paléarctique, migrateur en Afrique.

Fam. TIMALIIDÉS

Turdoides plebeja platycircus (Swainson). — Ndilla, 13-25-28-30-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce *platycircus* du Sénégal au Nigeria.

Fam. DICRURIDÉS

Dicrurus ad. adsimilis (Bechstein). — Ndilla, 25-IX ; observé à Linndé, 14-IX, Yonoféré, 18-IX et Tatki, 10-XI. Individu jeune à faible échancrure de la queue. — Espèce éthiopienne, la forme typique en savane, du Sénégal à l'Afrique australe.

Fam. LANIIDÉS

Lanius b. barbatus (Linné). — Ndilla, 7, 21, 26, 28-IX ; Dagana, 11-XI. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal au Tchad.

Lanius s. senator Linné. — Mbané, 8-XI. — Nicheur en Europe, migrateur dans l'Ouest africain.

Lanius senator badius Hartlaub. — Mbané, 8-XI, Tatki, 10-XI. — Nicheur en Afrique du Nord, migrateur dans l'Ouest africain de septembre à avril.

Nilais a. afer (Latham). — Somdandé, 19-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal au Nil et à l'Uganda.

Corvinella c. corvina (Shaw). — Ranerou, 18-IX, observé à Linndé, 14-IX et à Yonoféré le 18-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal à la Sierra Leone et au Nil blanc.

Tchagra senegala (Linné). — Somdandé, 11-IX. — Toute l'Afrique, sauf en forêt.

Fam. HIRUNDINIDÉS

Hirundo r. rustica Linné. — Richard-Toll, 11-XI. — Espèce paléarctique migratrice en Afrique.

Fam. NECTARINIIDÉS

Nectarinia p. pulchella (Linné). — Somdandé, 10-19-IX ; Ndilla, 13-IX. Un poussin observé en novembre à Richard-Toll. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sud de la Mauritanie au Kordofan.

Fam. FRINGILLIDÉS

Gymnoris d. dentata (Sundevall). — Somdandé, 19-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sud de la Mauritanie au Sud Ouest de l'Arabie.

Passer g. griseus (Vieillot). — Ndilla, 7-13-21-22-25-IX ; Linguère 8-IX ; Richard-Toll, 10-XI ; très commun partout. — Savanes africaines du Sénégal à la Mer Rouge, au Congo et à la Rhodésie.

Fam. PLOCÉIDÉS

Amadina f. fasciata (Gmelin). — Ndilla, 13-IX ; observé à Linndé, 14-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sud de la Mauritanie et du Sénégal au Nil et au lac Rudolph.

Bubalornis a. albirostris (Vieillot). — Ndilla, 21-IX ; Mbané, 8-XI ; Tatki, 10-XI ; Ndiakhaye, 17-XI ; très commun partout. Pontes observées en septembre. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce typique du Sud de la Mauritanie à l'Éthiopie.

Estrilda s. subflava (Vieillot). — Observé à Richard-Toll, XI-1967. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal à l'Éthiopie et au Ruwenzori.

Euodice c. cantans (Gmelin). — Mbané, 8-XI ; observé à Ndilla, 9-IX et Tatki, 10-XI ; ponte et poussins à Mbané, XI. — De la Mauritanie et du Sénégal à l'Arabie.

Euplectes orix franciscana (Isert). — Ndilla, 7-IX-1967. — Du Sénégal au Nil.

Hypochoera chalybeata (P. L. S. Müller). — Ndilla, 7-28-30-IX. Commun dans presque toutes les stations au Ferlo central et dans la vallée du Fleuve. — Du Sénégal à l'Air.

Lagonosticta s. senegala (Linné). — Richard-Toll, 14-15-16-XI ; observé partout, tant au Ferlo central que dans la vallée du fleuve. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal au Nigeria.

Plesiositagra v. vitellina (Lichtenstein). — Linguère, 15-IX ; Ndilla, 7-13-21-30-IX ; Somdandé, 10-IX ; très commun partout. Ponte et poussins observés en septembre. Dans un même groupe de nids on observe des pontes à œufs bleu-vert et des pontes à œufs blancs. — Du Sud de la Mauritanie et du Sénégal au Sennaar et à l'Uélé.

Pytilia melba citerior Strickland. — Observé à Ndilla, IX. — Espèce éthiopienne, la forme *citerior* du Sénégal à la vallée du Nil.

Quelea q. quelea (Linné). — Richard-Toll, 9-XI. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sud de la Mauritanie à l'Oubangui.

Sitagra l. luteola (Lichtenstein). — Ndilla, 13-IX. — Du Sud de la Mauritanie à l'Érythrée.

Sporopipes f. frontalis (Daudin). — Somdandé, 19-IX. — Espèce éthiopienne du Sud de la Mauritanie à l'Éthiopie.

Steganura orientalis aucupum Neumann. — Somdandé, 11-IX ; Ndilla, 13-IX. — Espèce éthiopienne, la sous-espèce *aucupum* du Sud de la Mauritanie au Tchad.

Uraeginthus b. bengalus (Linné). — Ndilla, 13-22-29-IX ; très commun partout, aussi bien dans le Ferlo que dans la vallée du Fleuve. Pontes observées en septembre. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sud de la Mauritanie à la Guinée portugaise et à l'Érythrée.

Vidua macroura (Pallas). — Observé à Ndilla, 9-IX et Barkedji, 13-IX. — Toute l'Afrique au Sud du Sahara.

Fam. ALAUDIDÉS

Eremopteryx leucotis melanocephala (Lichtenstein). — Tatki, 10-XI. — Espèce éthiopienne, la forme *melanocephala* du Sud de la Mauritanie et du Sénégal au Nil.

Galerida cristata senegalensis (P. L. S. Müller). — Richard-Toll, 9-15-XI ; Ranerou, 18-IX. — Espèce paléarctique et éthiopienne, la sous-espèce *senegalensis* du Sud de la Mauritanie à la Sierra Leone et au Niger.

Fam. MOTACILLIDÉS

Motacilla a. alba Linné. — Linguère, 12-IX ; Dagana, 11-XI. — Nicheur en Europe, signalé dans l'Ouest africain d'octobre à avril.

Budytes flavus (Linné). — Linguère, 12-IX, exemplaire juvénile ; Ndilla, 28-IX ; Richard — Toll, 11-XI. — Espèce paléarctique.

Fam. STURNIDÉS

Lamprocolius p. purpureus (P. L. S. Müller). — Linguère, 23-IX. Très commun dans toutes les stations. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal au Darfour.

Lamprotornis caudatus (P. L. S. Müller). — Ndilla, 7-26-30-IX. Très commun partout. — Du Sénégal au Kordofan.

Spreo p. pulcher (P. L. S. Müller). — Linguère, 15-IX ; Somdandé, 19-IX ; Ndiakhaye, lac de Guiers, 17-XI. Très commun partout. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sud de la Mauritanie à la Mer Rouge.

Buphagus a. africanus Linné. — Ndilla, 7-IX. Très commun dans toutes les stations. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal au Sud-Ouest de l'Éthiopie.

Fam. ORIOLIDÉS

Oriolus a. auratus Vieillot. — Linndé, 14-IX ; observé à Ndilla, 9-IX. — Espèce éthiopienne, la forme typique du Sénégal au Sud de l'Éthiopie et au Nord de l'Angola.

Fam. CORVIDÉS

Corvus albus P. L. S. Müller. — Observé à Linguère, Ndilla, Ranerou, IX. — Afrique du Nord au Sind, au Cap et à Madagascar, sauf en forêt.

Ptilostomus afer (Linné). — Observé à Linndé, 14-IX. — Du Sénégal au Nil.